



Assim Pega:



Sexo sem camisinha (oral, vaginal ou anal)



Compartilhamento de seringas ou agulhas



A mãe infectada pode transmitir o HIV para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação

Assim não Pega:



Sexo com camisinha



Piscina, banheiros, pelo ar



Aperto de mão ou abraço



Beijo



Compartilhar talheres e copos



Suor e lágrima



Masturbação a dois



Doação de sangue

Fevereiro/2011

Teste de aids: FAÇA SIM

O HIV pode ser transmitido pelo sangue, sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno.



Secretaria de Políticas para as Mulheres

Ministério da Saúde



FiqueSabendo

Se transou sem camisinha, faça o teste de aids. É rápido, seguro e sigiloso.

O que é o teste de aids?

É um teste que diz se a pessoa tem ou não o HIV, o vírus da aids. Ele pode ser rápido, o resultado sai na hora, ou laboratorial, onde o resultado sai em torno de 15 dias.

Qual a importância de fazer o teste?

- Se você tiver o HIV, é importante saber o quanto antes. Assim, você inicia o tratamento no momento certo, o que pode lhe trazer mais qualidade de vida.
- Em caso de gravidez, mães soropositivas que fazem o acompanhamento e tratamento adequados têm grandes chances de terem filhos sem o HIV.

Por que fazer o teste?

- Se você manteve relação sexual (oral, vaginal ou anal) sem camisinha.
- Durante o pré-natal (gestantes).

- Se teve alguma doença sexualmente transmissível (DST), tuberculose ou hepatites.
- Se compartilhou seringas ou agulhas.

Onde fazer o teste?

- Em uma Unidade de Saúde ou em um Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA.
- Se você fez sexo sem camisinha, espere pelo menos um mês pra fazer o teste de aids, sífilis e hepatite. Ele é gratuito e só você fica sabendo. O tratamento também é gratuito.
- Encontre o serviço mais próximo de você, ligue para o Disque Saúde **080061 1997** ou acesse **www.aids.gov.br** ou **www.saude.gov.br**



www.camisinhaevou.com.br

sexo, só se for com
camisinha. senão não dá.