



30
anos
de luta contra a AIDS



Ministério da
Saúde



DST

Protocolo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas:

Atenção integral às pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis entrará em consulta pública em abril/2015 pelo site da CONITEC: www.conitec.gov.br e será lançado no X Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis e VI Congresso Brasileiro de Aids Congresso da Sociedade Brasileira de DST, que acontecerá em maio/2015, em São Paulo

Em elaboração

Caderno de Boas Práticas sobre o uso da penicilina na Atenção Básica,

Abrangendo seis municípios apontados pelo 1º ciclo da PMAQ:

- Vitória da Conquista (BA), Aparecida de Goiânia (GO), Londrina (PR), Campinas (SP), São Paulo (SP) e Macapá (AP)

Vigilância nacional da resistência antimicrobiana de *N. gonorrhoeae*

PROJETO SENGONO



DISQUE SAÚDE
136
SALVADOR

2ª dose vacinação contra o **HPV**

Cada menina é de um jeito,
mas todas precisam de proteção.

É preciso tomar a 2ª dose para estar protegida contra o câncer do colo de útero.

Meninas de 11 a 13 anos devem ser vacinadas.

Fique atenta ao período de vacinação na escola da sua filha ou procure uma unidade de saúde.

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde

SUS+

Ministério da Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA


- Portaria para que adolescentes e mulheres vivendo com o HIV sejam vacinadas na faixa etária de 9 a 26 anos e modificando o esquema de vacinação (0,2 e 6 meses) em vigor
- Projeto sobre a prevalência do HPV apresentado ao PROADI-SUS

Estratégia de capacitação a distância por meio do Telelab para testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite B e C



www.telelab.aids.gov.br

Estratégias de Implantação do Protocolo de Investigação de Transmissão Vertical de HIV/Sífilis



- A transmissão vertical do HIV e da sífilis como “**evento sentinela**” ;
- Cada caso representa uma falha na identificação da gestante infectada ou na aplicação das medidas profiláticas para diminuir a transmissão;
- Identificar os determinantes da transmissão vertical do HIV e da sífilis;
- Propor medidas que possam corrigir falhas na prevenção, assistência e vigilância da transmissão vertical do HIV e da sífilis, no pré-natal, parto e puerpério;
- **Atualmente 12 municípios capitais tem comitês funcionantes**


Hepatites virais

Avanços

Vigilância Epidemiológica – Modelo Matemático usa dados locais e ajuda iluminar resposta


HAV:

- **Decréscimo** importante no número de casos novos a partir de 2005
- Concentração na **infância**



HBV:


- **S, SE:** Maior número de casos
- **N, NE, CO:** Idade média de diagnóstico menor




Vigilância Epidemiológica

HCV


- Estima-se entre **1,4 a 1,7 milhões de infectados**
- S + SE: **86%** dos casos notificados (SE = 60%)
- Masculino: 45 anos / Feminino: 47 anos
 - Concentração faixa etária acima de 40 anos de idade



Hepatite C, Brasil 2004-2012, Sexo masculino



Hepatite C, Brasil 2004-2012, Sexo feminino



Para 2015: Uma revolução na área

- ❑ Revisão e atualização do PCDT da HB.

- ❑ Revisão e atualização do PCDT da HC e coinfeções HBV/HIV, HCV/HIV, HBV/HDV:
 - Incorporação da nova geração de antivirais com Sofosbuvir, Daclatasvir e Sofosbuvir
 - Oferta de tratamento de co-infecção com HIV
 - Oferta de tratamento de pré e pós transplante

- Implementação dos novos Protocolos depois da aprovação da CONITEC prevista para Abril/Maio

Prioridades para 2015


- Implementação do novo PCDT de Hep B e C
- Melhorar Vigilância em Hepatites Virais
- Trabalhar atividades Amazônicas (com países vizinhos também) para Hepatites B e Delta
- Fazer modelagem do impacto da vacina de Hep B junto ao DEVIT e FMUSP
- Financiar Estudo Nacional de Prevalência das Hepatites B e C no Brasil

HIV/AIDS

HIV e AIDS no Brasil, Epidemia Concentrada



✓ 0,4% Taxa de Prevalência na População Geral



Ministério da Saúde



Jovens 15 a 24 anos

✓ **2013** – Casos Reportados de AIDS 4.414

Taxa de Detecção de **12,7** por 100.000 habitantes

✓ **2004** – Casos Reportados de AIDS 3.453

Taxa de Detecção de **9,6** por 100.000 habitantes



Dentre as grandes novidades está o foco na juventude desde 08/2014 e o VMS



Campanha de Prevenção de 2015



Facebook

Posters



Tinder and Horner



TV and Internet Movie



Ministério da Saúde





Oferta – prevenção e testagem - 2014



Teste de HIV de fluido oral - 60 ONGs apoiadas

- 11.413 testes realizados em 9 meses em populações chave



Ministério da Saúde




Protocolo Clínico de Tratamento em Adulto (Dezembro 2013)




- ❑ Lançado em 1 de Dezembro, 2013.
- ❑ Trata todos os HIV positivos independentemente de nível de CD4
- ❑ Introdução da definição de uma primeira linha de tratamento (tenofovir, efavirenz and lamivudina) similar ao Guidelines da OMS.

TRATAMENTO como PREVENÇÃO



Acesso ao Tratamento no Brasil – 1999 to 2014

Numero de Pessoas Vivendo com HIV em Tratamento




**Mais de 400,000
PLWH em ARV**

Target 90 / 90 / 90 in 2020 – Fast Track



- ✓ Brasil tem cerca de 80% de pessoas testadas; cerca de 67% em tratamento e mais de 60% com carga viral suprimida. Dos atuais em tratamento, 88% apresenta supressão de carga viral.




Ministério da Saúde



Supressão de Carga Viral




✓ Estabilidade em 2014 de pessoas em tratamento há 6 meses com carga viral suprimida mostra boa aderência ao novo protocolo.



Ministério da Saúde



Prevenção Combinada é a Palavra de Ordem no Brasil e no Mundo



O que ainda falta!

Droga Usada nos dois Estudos em Curso com apoio do DDAHV:

- ❑ FDC Tenofovir and Emtricitabina (Truvada)



Uma pílula por dia
pode salvar ainda mais
vidas



**Enquanto isto
os
conservadores
e seus porta
vozes avançam
no país**



Frente Parlamentar de Luta Contra a AIDS



Reação à Criminalização Da Transmissão do HIV

