



Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS

Marcelo Freitas
Coordenação de Assistência e Tratamento
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
Ministério da Saúde

Brasília, 12 de fevereiro de 2016.





Monitoramento Clínico

Importância do exame de Carga Viral

- Sucesso do tratamento
- Resistência ao ARV
- Redução da resistência transmitida

Recomendação para realização do exame a cada 6 meses



Ações do Departamento

Monitoramento das informações de CV no SICLOM

- Importação dos resultados dos exames de CV do SISCEL
- Abertura de campo para o dispensador da UDM digitar o resultado do exame conforme informação preenchida pelo médico no Formulário de Solicitação de Medicamento (apenas para resultados mais recentes, divergentes ou inexistentes no SICLOM)



Ações do Departamento

Monitoramento das informações de CV no SICLOM

- Lembrete com 6 meses de realizado ultimo exame para informar ao usuário da necessidade de realização do novo exame
- Bloqueio com 12 meses de realizado o ultimo exame, solicitando justificativa para dispensação do medicamento
- Carta para o usuário informando da necessidade de novo exame e orientação para o médico.




Meta 90-90-90 em 2020

Gráfico 18. Tendências temporais na cascata de cuidado contínuo do Brasil, 2012-2014.



AMBITIOUS TREATMENT TARGETS:
WRITING THE FINAL CHAPTER OF THE AIDS EPIDEMIC



Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais/Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom).





Importância do Monitoramento Clínico

- Políticas Públicas mais eficientes
- Saúde Coletiva x Individual
- Melhoria da Qualidade de Vida das PVHA
- Informações dos serviços privados



SIMC

**Sistema de Monitoramento
Clínico**




O SIMC é um sistema que, atualmente, permite visualizar e monitorar:

1. “*GAP* de tratamento”: pessoas vivendo com HIV que ainda não iniciaram a terapia antirretroviral. Além dos nomes das pessoas em *GAP*, são informados a data e o valor de seu último exame de CV.
2. Pessoas que tiveram sua terapia antirretroviral iniciada ou modificada há 6 meses ou mais, e que apresentam carga viral detectável. Além do resultado da carga viral, são informadas as datas de realização do exame e de início do último tratamento.




COMO OS DADOS DO GAP SÃO OBTIDOS



Cruzando-se os bancos de dados do SISCEL* e do SICLOM**. As pessoas inseridas no SIMC são aquelas cujos nomes constam no SISCEL mas não constam no SICLOM, ou seja, que já foram vinculados a um serviço de saúde e realizaram exames de seguimento de HIV no SUS (carga viral e CD4), mas que não iniciaram a terapia antirretroviral.



COMO OS DADOS DE CARGA VIRAL PARA O SIMC SÃO OBTIDOS



Cruzando-se os bancos de dados do SICLOM e do SISCEL. As pessoas inseridas no SIMC são aquelas em terapia antirretroviral há pelo menos 6 meses com o mesmo esquema terapêutico, e que apresentam carga viral acima de 50 cópias/mm³.



Próximos Passos

- Eliminação do GAP de tratamento
- Análise dos casos de PVHA em tratamento a mais de 6 meses com CV detectável
- A partir de janeiro de 2017 obrigatoriedade do número da Notificação do SINAN (Sistema de Informação de Agravo de Notificação), no SICLOM.



Obrigado!

Marcelo Freitas

Coordenação Assistência e Tratamento

marcelo.freitas@ aids.gov.br